

## Annexe

Gestion et prévention des événements indésirables liés aux médicaments à l'urgence de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ-UL) : retombées de la participation du pharmacien. *Pharmactuel* 2018;51:24-34.

**Tableau VI.** Pathologies observées et volontairement omises dans la discussion

	Groupe sans intervention (n = 165)	Groupe avec intervention (n = 71)	p
Anémie, n (%)	16 (9,7)	2 (2,8)	0,1
Arthrose, n (%)	4 (2,4)	1 (1,4)	1,0
Dégénérescence maculaire liée à l'âge, n (%)	2 (1,2)	3 (4,2)	0,2
Épilepsie, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Fibromyalgie, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Fibrose pulmonaire, n (%)	3 (1,8)	1 (1,4)	1,0
Glaucome, n (%)	7 (4,2)	2 (2,8)	0,7
Goutte, n (%)	6 (3,6)	3 (4,2)	1,0
Hyperplasie bénigne de la prostate, n (%)	7 (4,2)	2 (2,8)	0,7
Hyperthyroïdie, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Hypotension orthostatique, n (%)	3 (1,8)	1 (1,4)	1,0
Hypothyroïdie, n (%)	26 (15,8)	13 (18,3)	0,7
Migraine, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Myasthénie grave, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Ostéoporose, n (%)	4 (2,4)	1 (1,4)	0,4
Polyarthrite rhumatoïde, n (%)	2 (1,2)	2 (2,8)	0,6
Psoriasis, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Reflux gastro-œsophagien et dyspepsie, n (%)	16 (9,7)	10 (14,1)	0,4
Remplacement valvulaire cardiaque, n (%)	9 (5,5)	3 (4,2)	1,0
Thromboembolie veineuse (active ou ancienne), n (%)	8 (4,8)	5 (7,0)	0,8
Trouble déficitaire de l'attention (avec ou sans hyperactivité), n (%)	1 (0,6)	0 (0)	1,0
Troubles cognitifs, n (%)	5 (3,0)	1 (1,4)	0,7
Troubles psychiatriques <sup>a</sup> , n (%)	8 (4,8)	5 (7,0)	0,5

<sup>a</sup>Y compris dépression, anxiété, maladie affective bipolaire, schizophrénie

**Tableau VII.** Médication observée et volontairement omise dans la discussion

	Groupe sans intervention (n = 165)	Groupe avec intervention (n = 71)	p
5-aminosalicylates, n (%)	3 (1,8)	1 (1,4)	1,0
Acétaminophène, n (%)	39 (23,6)	15 (21,1)	0,7
Agonistes dopaminergiques, n (%)	1 (0,6)	0 (0)	1,0
Allopurinol, n (%)	11 (6,7)	5 (7,0)	1,0
Anticholinergiques destinés à l'hyperactivité vésicale, n (%)	2 (1,2)	1 (1,4)	1,0
Anticorps monoclonaux, n (%)	5 (3,0)	2 (2,8)	1,0
Antihistaminiques H1, n (%)	7 (4,2)	4 (5,6)	0,7
Antiviraux, n (%)	1 (0,6)	0 (0)	1,0
Bêta-agonistes inhalés courte action, n (%)	29 (17,6)	14 (19,7)	0,7
Betahistine, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Biphosphonates, n (%)	11 (6,7)	4 (5,6)	1,0
Bloqueurs alpha-adrénergiques non sélectifs, n (%)	2 (1,2)	3 (4,2)	0,2
Bloqueurs alpha-adrénergiques sélectifs, n (%)	16 (9,7)	7 (9,9)	1,0
Capécitabine, n (%)	1 (0,6)	3 (4,2)	0,2
Clonidine, n (%)	5 (3,0)	0 (0)	0,3
Colchicine, n (%)	2 (1,2)	1 (1,4)	1,0
Colésévélam, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Contraceptifs oraux combinés, n (%)	1 (0,6)	0 (0)	1,0
Corticostéroïdes nasaux, n (%)	22 (13,3)	4 (5,6)	0,1
Corticostéroïdes topiques, n (%)	19 (11,5)	4 (5,6)	0,2
Darbépoïétine, n (%)	1 (0,6)	0 (0)	1,0
Dicyclomine, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Digoxine, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Filgrastim, n (%)	1 (0,6)	0 (0)	1,0
Gouttes antiglaucomateuses, n (%)	10 (6,1)	3 (4,2)	0,8
Héparine de bas poids moléculaire, n (%)	2 (1,2)	3 (4,2)	0,2

**Tableau VII.** Médication observée et volontairement omise dans la discussion (suite)

	Groupe sans intervention (n = 165)	Groupe avec intervention (n = 71)	p
Hormonothérapie de remplacement (féminine et masculine), n (%)	5 (3,0)	2 (2,8)	1,0
Hydralazine, n (%)	2 (1,2)	1 (1,4)	1,0
Hydroxychloroquine, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, n (%)	2 (1,2)	0 (0)	1,0
Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, n (%)	6 (3,6)	2 (2,8)	1,0
Inhibiteurs de la pompe à protons, n (%)	89 (53,9)	39 (54,9)	1,0
Inhibiteurs de phosphodiesterase 5, n (%)	3 (1,8)	1 (1,4)	1,0
Isotrétinoïne, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Laxatifs, n (%)	32 (19,4)	16 (22,5)	0,6
Levodopa-carbidopa, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Lévothyroxine, n (%)	34 (20,6)	18 (25,4)	0,5
Liraglutide, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Midodrine, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Montelukast, n (%)	3 (1,8)	0 (0)	0,6
Nitroglycérine sublinguale, n (%)	26 (15,8)	12 (16,9)	0,8
Ondansétron, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Orlistat, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Pancrélipase, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Pentoxifylline, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Procinétiques digestifs, n (%)	5 (3,0)	4 (5,6)	0,5
Pyridostigmine, n (%)	0 (0)	1 (1,4)	0,3
Quétiapine à dose quotidienne de 50 mg et moins, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Quinine, n (%)	2 (1,2)	0 (0)	1,0
Relaxants musculaires <sup>a</sup> , n (%)	3 (1,8)	3 (4,2)	0,4
Stimulants <sup>b</sup> , n (%)	2 (1,2)	0 (0)	1,0
Sulfonate de polystyrène sodique, n (%)	1 (0,6)	0 (0)	1,0
Tapazole, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5
Théophylline, n (%)	1 (0,6)	0 (0)	1,0
Thérapie de remplacement nicotinique, n (%)	2 (1,2)	0 (0)	1,0
Triptans, n (%)	1 (0,6)	1 (1,4)	0,5

<sup>a</sup>Y compris cyclobenzaprine et baclofène

<sup>b</sup>Y compris méthylphénidate et sels d'amphétamine