

Annexe

Plan de continuité d'activité : application en pharmacotechnie (Pharmactuel 2026;59:167-174)

LISTE DES PRÉPARATIONS NON STÉRILES RÉALISÉES PAR LE SECTEUR PHARMACOTECHNIE

Calcul de la quantité PRESCRITE

Poids de l'enfant	3	kg
Posologie	1	mg/kg/jour
Nombre de prises/jour	1	
Durée de prescription	28	jours

SOIT 3 mg de PRINCIPE ACTIF/jour en
SOIT 3 mg de PRINCIPE ACTIF/PRISE

Calcul de la quantité À PRÉPARER

Concentration	1	mg/ml
Volume à préparer	84	ml
Nombre de flacon	2	
Volume par flacon	42	ml

Type de préparation	Substance(s) active(s), dosage(s)/concentration	Forme pharmaceutique	Indications	Posologie	Informations complémentaires	Durée de conservation	Spécialités existantes	T° de conservation	Délai de mise à disposition
Préparation magistrale	(2,4) Diaminopyridine (plusieurs dosages)	Gélule	Syndromes myasthéniques congénitaux	Posologie : 1 mg/kg/jour réparti en 4 prises chez l'enfant Max : 60 mg/jour chez les adultes Initiation : 10 mg x2/jour en augmentant progressivement la dose de 10 mg jusqu'à 60 mg/jour en répartissant la dose en 3 prises voire 4 au maximum	La contraception est obligatoire pour la femme en âge de procréer. Créatininémie + bilan hépatique + ECG requis avant de débuter le traitement	28 jours	NON	Température ambiante	Classe 3 : 72 h à 5 jours
Préparation magistrale	4-aminopyridine 5 mg	Gélule	Sclérose en plaque	Posologie : 5 - 25 mg/jour	Abaisse le seuil épileptogène, prudence chez les patients ayant des troubles du rythme cardiovasculaire	28 jours	Fampyra® 10mg LP	Température ambiante	Classe 3 : 72 h à 5 jours
Préparation magistrale	Acétazolamide 25 mg/ml	Suspension buvable	Œdème	Dose usuelle : 5 mg/kg/dose ou 100 mg/m²/dose 1 fois/jour		28 jours	Diamox® 250 mg	Température ambiante	Classe 2 : 12 à 72 h
Préparation magistrale	Acétazolamide 25 mg/ml	Suspension buvable	Glaucome	Dose usuelle : 8 - 30 mg/kg/jour ou 300 - 900 mg/m²/jour en 3 prises	Photosensibilité	28 jours	Diamox® 250 mg	Température ambiante	Classe 2 : 12 à 72 h
Préparation magistrale	Acétazolamide 25 mg/ml	Suspension buvable	Épilepsie	Dose usuelle : 4 - 16 mg/kg/jour en 1 à 4 prises Dose max : 30 mg/kg/jour ou 1 g/jour	Forme libération prolongée non recommandée dans l'épilepsie	28 jours	Diamox® 250 mg	Température ambiante	Classe 2 : 12 à 72 h

Figure 4. Liste des préparations non stériles réalisées par le secteur pharmacotechnie au CHU Grenoble Alpes