

Annexe 4 : Échelle d'ajustement vierge

Licht C, Amoikon K, Connell L, Dupont C, Bonnici A. Évaluation d'un protocole d'administration d'insuline. Pharmactuel 2011;44:153-7.

ORDONNANCE D'INSULINE SOUS-CUTANÉE*Consulter un endocrinologue pour les diabétiques de type 1***MEDECIN – Sélectionner une des deux cases suivantes :** Une insulinothérapie basale est également utilisée** Aucune insulinothérapie basale n'est utilisée**** Si une insulinothérapie basale est utilisée, ajustez-la en ajoutant (+) ou en retranchant (-) les unités comme ci-dessous (SI AUCUN CHANGEMENT, ECRIRE BASALE)**

		<i>Déjeuner ou _____ h</i>	<i>Dîner ou _____ h</i>	<i>Souper ou _____ h</i>	<i>Coucher ou _____ h</i>
Insuline utilisée pour l'ajustement					
Glycémie capillaire	0,0 – 4,0 mmol/L	<i>Se référer au protocole d'hypoglycémie et après soustraire ____ unités de la prochaine dose d'insuline</i>			
	4,1 – 5,0				
	5,1 – 8,0				
	8,1 – 10				
	10,1 – 12				
	12,1 – 14				
	14,1 – 16				
	16,1 – 18				
>18 (Notifier le médecin)					

_____ Médecin consultant	_____ Nom	_____ Service	_____ # Licence	_____ JJ/MM/AAAA Date & heure
_____ Médecin traitant	_____ Nom	_____ Service	_____ # Licence	_____ JJ/MM/AAAA Date & heure
_____ Infirmière	_____ JJ/MM/AAAA Date & heure			