

Annexe 5 : Insulinothérapie basale et échelle d'ajustement (version proposée après l'évaluation)

Licht C, Amoikon K, Connell L, Dupont C, Bonnici A. Évaluation d'un protocole d'administration d'insuline. Pharmactuel 2011;44:153-7.

ORDONNANCE D'INSULINE SOUS-CUTANÉE

Consulter un endocrinologue pour les diabétiques de type 1

Doses d'insulinothérapie basale :

Insuline Médecin : parapher une insuline par case	<i>Déjeuner</i> ou _____h	<i>Dîner</i> ou _____h	<i>Souper</i> ou _____h	<i>Coucher</i> ou _____h
Action courte/rapide: _____ Humulin R® (réserve de l'étage) _____ Novolin Toronto® _____ Humalog® _____ Novorapid®	_____ unités	_____ unités	_____ unités	_____ unités
Action intermédiaire/longue : _____ Humulin N® (réserve de l'étage) _____ Novolin NPH® _____ Levemir® _____ Lantus®	_____ unités	_____ unités	_____ unités	_____ unités

Ajustement des doses d'insulinothérapie basale en ajoutant ou en retranchant les unités comme ci-dessous :

	<i>Déjeuner</i>	<i>Dîner</i>	<i>Souper</i>	<i>Coucher</i>	
Insuline utilisée pour l'ajustement					
Glycémie capillaire	0,0 – 4,0 mmol/L	<i>Traiter d'abord l'hypoglycémie en se référant au protocole d'hypoglycémie et après soustraire 4 unités de l'insuline basale à la prochaine dose.</i>			
	4,1 – 5,0	Soustraire 2 unités	Soustraire 2 unités	Soustraire 2 unités	Soustraire 2 unités
	5,1 – 10	Insulinothérapie basale			
	10,1 – 12	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
	12,1 – 14	+ 4	+ 4	+ 4	+ 3
	14,1 – 16	+ 6	+ 6	+ 6	+ 4
	16,1 – 18	+ 8	+ 8	+ 8	+ 5
	> 18 (Notifier le médecin)	+ 10	+ 10	+10	+ 6

Médecin consultant _____ Nom _____ Service _____ # Licence _____ JJ/MM/AAAA _____ Date & heure _____
 Médecin traitant _____ Nom _____ Service _____ # Licence _____ JJ/MM/AAAA _____ Date & heure _____
 _____ JJ/MM/AAAA _____
 Infirmière _____ Date & heure _____