

Module de formation continue du *Pharmactuel*

Le *Pharmactuel* offre un module de formation continue accessible à tous. L'Ordre des pharmaciens accordera 3 UFC aux pharmaciens ayant suivi cette formation.

Pour avoir accès au module de formation continue et répondre aux questions, vous devez vous rendre sur le site du *Pharmactuel* www.pharmactuel.com et cliquer sur « module de formation continue » dans la section « formation continue ». Vous pourrez ainsi imprimer le formulaire, répondre aux questions et nous le faire parvenir par télécopieur au 514 286-1081. Vous pouvez également accéder au module par le site de l'A.P.E.S. www.apesquebec.org, sous l'onglet « formation continue » dans la section « Activités en cours/à venir » sous « Activités d'autoapprentissage ».

QUESTIONS

ÉVALUATION CRITIQUE DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE

- Parmi les énoncés suivants relatifs à la prévalence des erreurs médicamenteuses en présence d'un prescripteur électronique et de cabinets automatisés décentralisés, lequel est **FAUX**?
 - En dépit de l'implantation de ces technologies, l'étude met en évidence un taux d'erreurs relativement élevé de 22 % liées aux médicaments.
 - Cette étude met en évidence l'obligation de bidirectionnalité entre le système pharmacie, le prescripteur électronique et finalement la FADM.
 - Les études ayant évalué les cabinets automatisés décentralisés sont plus nombreuses que celles ayant étudié les prescripteurs électroniques.
 - Les 18 interventions réalisées par les observateurs durant l'étude ont pu influencer la survenue de certaines erreurs en cours d'étude.
- Parmi les 479 erreurs médicamenteuses évaluées, quelle est la principale cause décelée?
 - Des problèmes de communication.
 - Le manque de procédures standardisées.
 - Le manque de connaissances liées aux médicaments.
 - Un stockage inadéquat.

PHARMACOTHÉRAPIE

- Parmi les énoncés suivants, lequel est **VRAI**?
 - L'incidence du rash est plus élevée sous l'effet des inhibiteurs des tyrosines kinases que sous celui des anticorps monoclonaux.
 - Le rash survenant à la suite de la prise du lapatinib ou du sunitinib peut se traiter de la même façon que celui provoqué par les iEGFR (inhibiteurs des récepteurs du facteur de croissance épidermiques).
 - La prévention de base efficace pour atténuer le rash papulo-pustulaire consiste à maintenir une hydratation adéquate de la peau.
 - L'emploi d'analogues synthétiques des tétracyclines, telles la minocycline et la doxycycline, est recommandé en raison de leur pouvoir antibactérien et du risque infectieux du rash papulo-pustulaire.
- Parmi les énoncés suivants, lequel est **FAUX**?
 - Les rayons UV causent une surexpression des récepteurs EGFR et aggravent le rash.
 - La cigarette peut aggraver le rash, il faut donc réduire les doses d'erlotinib pour ces patients.
 - Le rash peut disparaître spontanément même sans traitement.
 - Le rash peut causer de la douleur, des troubles du sommeil et des symptômes dépressifs chez les patients qui en sont atteints.

- En plus du rash papulo-pustulaire, quels autres effets secondaires peuvent survenir à la suite de la prise d'un iEGFR (inhibiteurs des récepteurs du facteur de croissance épigFR)?
 - Xérose
 - Paronychie
 - Alopécie
 - Conjonctivite
 - Toutes ces réponses
- Les corticostéroïdes oraux sont fréquemment utilisés pour traiter le rash secondaire aux iEGFR (inhibiteurs des récepteurs du facteur de croissance épigFR)? **VRAI** ou **FAUX**?
 - Vrai
 - Faux

CAS CLINIQUE EN DIRECT DE L'UNITÉ

- Des cas d'ischémie myocardique ou d'infarctus du myocarde ont été rapportés en présence de tous les médicaments suivants sauf un. Lequel?
 - Clozapine
 - Bléomycine
 - Sumatriptan
 - Citalopram
- Tous les patients ayant subi un syndrome coronarien aigu alors qu'ils étaient traités avec de la varénicline peuvent reprendre ce médicament sans problème immédiatement après cet événement. **VRAI** ou **FAUX**?
 - Vrai
 - Faux
- Concernant l'utilisation d'aides médicamenteuses à l'arrêt tabagique pour les patients ayant subi un syndrome coronarien aigu, quel énoncé est **VRAI**?
 - Pour les patients souffrant de symptômes importants de sevrage à la nicotine, il est possible d'entreprendre une thérapie de remplacement de la nicotine durant l'hospitalisation pour un SCA (syndrome coronarien aigu).
 - Il existe plusieurs études à répartition aléatoire comparant les différentes thérapies pour les patients venant de subir un SCA.
 - Aucune étude évaluant l'efficacité et l'innocuité du bupropion auprès de patients venant de subir un SCA n'a été effectuée jusqu'à maintenant.
 - Une étude à répartition aléatoire a permis d'établir l'efficacité et l'innocuité de la varénicline pour les patients venant de subir un SCA.

AU CENTRE DE L'INFORMATION

- Le risque d'insuffisance surrénalienne en présence du ciclésonide est nul. **VRAI** ou **FAUX**?
 - Vrai
 - Faux

Veillez noter que le questionnaire sera disponible en ligne et à l'A.P.E.S. jusqu'au 31 mars 2013 inclusivement.

FORMULAIRE DE RÉPONSE POUR L'OBTENTION D'UNITÉS DE FORMATION CONTINUE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC

ACTIVITÉ

Titre : Pharmactuel, volume 45, numéro 4 (Octobre – Novembre - Décembre 2012)

Type : Autoapprentissage (publication électronique)

Date(s) : Du 1^{er} décembre au 31 mars 2013

Répondre à toutes les questions. SVP écrire lisiblement. Les réponses illisibles, ambiguës ou multiples seront rejetées.

Noircir les cases appropriées											
1	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>			6	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>		
2	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>			7	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>
3	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>			8	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>		
4	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>			9	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>
5	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>		10	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>		

Nom : _____

Prénom : _____

Téléphone : _____

Date : _____ N° de permis : _____

Lieu d'exercice : Établissement Officine Industrie Autre

Cette activité a fait l'objet d'une demande d'accréditation par l'Ordre des pharmaciens du Québec afin que des UFC soient accordées aux participants qui auront un minimum de 7 bonnes réponses sur 10.

Veillez retourner ce formulaire par la poste ou par télécopieur à :

Nicole Germain, adjointe administrative
A.P.E.S.
4050, rue Molson, bureau 320
Montréal (Québec) H1Y 3N1
Télécopieur : 514 286-1081