

Le *Pharmactuel* offre un module de formation continue accessible à tous. L'ordre des pharmaciens accordera 3 UFC aux pharmaciens ayant suivi cette formation.

Pour avoir accès au module de formation continue et répondre aux questions, vous devez vous rendre sur le site du *Pharmactuel* www.pharmactuel.com et cliquer sur « Module de formation continue » dans la section « Formation continue ». Vous pourrez ainsi imprimer le formulaire, répondre aux questions et nous le faire parvenir par télécopieur au 514 286-1081 ou par courriel à l'adresse suivante: coordonnateur@pharmactuel.com. Vous pouvez également accéder au module par le site de l'A.P.E.S. www.apesquebec.org, sous l'onglet « formation continue » dans la section « Activités en cours/à venir » sous « Activités d'autoapprentissage ».

Questions

ÉVALUATION CRITIQUE DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE

- Vrai ou Faux. Dans l'étude EINSTEIN-PE, le rivaroxaban était utilisé seul, c'est-à-dire sans le recours concomitant à une héparine de faible poids moléculaire, dès le début du traitement de l'embolie pulmonaire**
 - Vrai
 - Faux
- Parmi les populations suivantes, à quels patients peut-on extrapoler les résultats de l'étude EINSTEIN-PE?**
 - Patients souffrant d'insuffisance rénale sévère (Clcr < 30 mL/min)
 - Patients n'ayant pas reçu d'agent thrombolytique à l'urgence
 - Patients présentant une embolie pulmonaire massive
 - Patient sous inhibiteur de protéase contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
- Vrai ou Faux. Il faut éviter d'administrer du rivaroxaban aux patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 15 ml/minute.**
 - Vrai
 - Faux
- Parmi les énoncés suivants se rapportant au rivaroxaban, lequel est FAUX ?**
 - Il s'agit d'un inhibiteur direct du facteur Xa
 - Cette molécule n'est pas approuvée au Canada pour la prévention de la thrombose veineuse profonde
 - L'emploi du rivaroxaban n'est pas recommandé pour les patients souffrant d'un cancer actif
 - Il n'existe aucun antidote pour renverser l'effet du rivaroxaban dans les situations d'urgence

CAS CLINIQUE EN DIRECT DE L'UNITÉ

- Vrai ou Faux. Le patient qui a été stabilisé avec de la phénytoïne et qui entreprend un traitement à la ciprofloxacine doit subir un dosage de phénytoïne durant les premiers jours de la prise de l'antibiotique.**
 - Vrai
 - Faux

- Les principaux cytochromes impliqués dans le métabolisme de la phénytoïne sont les suivants sauf un. Quel est l'intrus ?**
 - CYP 3A4
 - CYP 2D6
 - CYP 2C9
 - CYP 2C19
- Parmi les énoncés suivants se rapportant à la phénytoïne, lequel est FAUX ?**
 - La demi-vie varie en fonction de la formulation du produit
 - Dans un contexte aigu, le suivi de la phénytoïne est recommandé tous les sept jours
 - Les niveaux visés se situent entre 40 et 80 µmol/L
 - L'état d'équilibre est généralement atteint en deux jours
- L'absorption de la phénytoïne par les patients nourris par gavage peut être diminuée en raison de la liaison de la molécule à certains éléments du gavage (calcium, protéines, etc.)**
 - Vrai
 - Faux

AU CENTRE DE L'INFORMATION

- Vrai ou Faux. Concernant la vague médiatique française sur les contraceptifs oraux combinés, elle a eu un retentissement sur le profil de prescription des contraceptifs oraux combinés en France en faveur des contraceptifs oraux combinés de 2^e génération.**
 - Vrai
 - Faux
- Vrai ou Faux. Concernant les risques liés à l'acétate de cyproterone/éthinyloestradiol, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada incite les professionnels de la santé à ne pas prescrire ces produits comme contraceptif oral, compte tenu du risque de thromboembolie veineuse qu'ils impliquent.**
 - Vrai
 - Faux

Veillez noter que le questionnaire sera disponible en ligne et à l'A.P.E.S. jusqu'au 30 juin 2015 inclusivement.

FORMULAIRE DE RÉPONSE POUR L'OBTENTION D'UNITÉS DE FORMATION CONTINUE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC

ACTIVITÉ
Titre : Pharmactuel, volume 47, numéro 2 (Avril-Mai-Juin 2014)
Type : Autoapprentissage (publication électronique)
Date(s) : Du 1^{er} juillet 2014 au 30 juin 2015

Répondre à toutes les questions. SVP écrire lisiblement. Les réponses illisibles, ambiguës ou multiples seront rejetées.

Noircir les cases appropriées										
1	VRAI	FAUX				6	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>
2	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>		7	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>
3	VRAI	FAUX				8	VRAI	FAUX		
4	A <input type="radio"/>	B <input type="radio"/>	C <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>		9	VRAI	FAUX		
5	VRAI	FAUX				10	VRAI	FAUX		

Nom : _____

Prénom : _____

Téléphone : _____

Date : _____ N° de permis : _____

Lieu d'exercice : Établissement Officine Industrie Autre

Cette activité a fait l'objet d'une demande d'accréditation par l'Ordre des pharmaciens du Québec afin que des UFC soient accordées aux participants qui auront un minimum de 7 bonnes réponses sur 10.

Veillez retourner ce formulaire par courriel (coordonnateur@pharmactuel.com), par la poste ou par télécopieur à :

A.P.E.S.
 4050, rue Molson, bureau 320
 Montréal (Québec) H1Y 3N1
 Télécopieur : 514 286-1081